

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE.** Flucelvac Tetra sospensione iniettabile in siringa preimpilata. Vaccino antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari). **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA.** Antigeni di superficie del virus dell'influenza (emoagglutinina e neuraminidasi), inattivati, dei ceppi\* equivalenti: A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09 ceppo equivalente (A/Georgia/12/2022, CVR-167) 15 microgrammi HA\*\*; A/Massachusetts/18/2022 (H3N2)-ceppo equivalente (A/Sydney/1304/2022, wild type) 15 microgrammi HA\*\*; B/Austria/1359417/2021-ceppo equivalente (B/Singapore/WUH4618/2021, wild type) 15 microgrammi HA\*\*; B/Phuket/3073/2013-ceppo equivalente (B/Singapore/INFTT-16-0610/2016, wild type) 15 microgrammi HA\*\* per una dose da 0,5 mL.

\* Propagato in cellule Madin Darby Canine Kidney (MDCK). \*\* HA=emoagglutinina. Il vaccino è conforme alla raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (emisfero settentrionale) e alla decisione EU per la STAGIONE 2024/2025. Flucelvac Tetra può contenere tracce di beta-propiolattone, cetiltrimetilammonio bromuro e polisorbato 80 (vedere paragrafo 4.3). Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. **3. FORMA FARMACEUTICA.** Sospensione iniettabile (preparazione iniettabile). Liquido da limpido a leggermente opalescente. **4. INFORMAZIONI CLINICHE.**

**4.1. Indicazioni terapeutiche.** Profilassi dell'influenza negli adulti e nei bambini a partire dall'età di 2 anni. Flucelvac Tetra deve essere usato in conformità con le raccomandazioni ufficiali. **4.2. Posologia e modo di somministrazione.** **Posologia.** *Adulti e bambini da 2 anni d'età.*

Gruppo di età	Dose	Schema
Da 2 a <9 anni	Una o due <sup>a</sup> dosi da 0,5 mL	Se 2 dosi, somministrarle a distanza di almeno 4 settimane
Età pari o superiore a 9 anni	Una dose da 0,5 mL	Non pertinente

<sup>a</sup> I bambini di età inferiore a 9 anni che non sono stati vaccinati in precedenza contro l'influenza devono ricevere una seconda dose.

**Bambini di età inferiore a 2 anni.** La sicurezza e l'efficacia di Flucelvac Tetra nei bambini dalla nascita a un'età inferiore a 2 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. **Modo di somministrazione.** Esclusivamente per iniezione intramuscolare. La sede preferita per l'iniezione è il muscolo deltoideo del braccio. I bambini piccoli con massa deltoidea insufficiente devono essere vaccinati sulla parte anterolaterale della coscia. Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica e non deve essere miscelato con altri vaccini nella stessa siringa. Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. **4.3. Controindicazioni.** Ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o a possibili residui in tracce, quali beta-propiolattone, cetiltrimetilammonio bromuro e polisorbato 80. **4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego.** **Tracciabilità.** Per migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente documentati. **Ipersensibilità e anafilassi.** Deve essere sempre rapidamente disponibile un adeguato trattamento e supervisione medica, nella rara eventualità di comparsa di reazioni anafilattiche in seguito alla somministrazione del vaccino. **Malattia concomitante.** La vaccinazione deve essere rinviata in pazienti con malattia febbrile fino alla scomparsa della febbre. **Trombocitopenia e disturbi della coagulazione.** Come tutti i vaccini iniettabili, Flucelvac Tetra deve essere somministrato con cautela ai soggetti affetti da trombocitopenia o disturbi della coagulazione, dal momento che dopo la somministrazione intramuscolare possono verificarsi emorragie. **Generale.** Una sincope (svenimento) può manifestarsi dopo o anche prima di qualsiasi vaccinazione, come risposta

psicogena all'iniezione con l'ago. Questa può essere accompagnata da svariati segni neurologici quali disturbi visivi transitori, parestesia e movimenti tonico-clonici degli arti durante il recupero. È importante che siano disponibili misure idonee a evitare lesioni dovute allo svenimento. Nei pazienti con immunosoppressione endogena o iatrogena la risposta anticorpale può essere insufficiente a prevenire l'influenza. È possibile che la risposta immunitaria protettiva non venga indotta in tutti i soggetti vaccinati. **Eccipienti con effetti noti.** *Sodio.* Questo vaccino contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente 'senza sodio'. *Potassio.* Questo vaccino contiene potassio, meno di 1 mmol (39 mg) per dose, cioè essenzialmente 'senza potassio'. **4.5. Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione.** Non sono stati effettuati studi d'interazione con Flucelvac Tetra. Non ci sono dati disponibili sulla co-somministrazione di Flucelvac Tetra con altri vaccini. In base all'esperienza clinica con il vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero (*cell-based trivalent influenza vaccine, TIVc*), Flucelvac Tetra può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini.

**4.6. Fertilità, gravidanza e allattamento.** **Gravidanza.** I vaccini antinfluenzali inattivati, come Flucelvac Tetra, possono essere somministrati in qualsiasi fase della gravidanza. Sull'uso dei vaccini durante il secondo o terzo trimestre, è disponibile una maggiore quantità di dati di sicurezza, rispetto al primo trimestre; tuttavia, i dati ottenuti a seguito dell'uso del vaccino antinfluenzale in tutto il mondo non indicano effetti avversi fetali e materni attribuibili al vaccino. Negli Stati Uniti è stato istituito un registro prospettico dell'esposizione in gravidanza e sono stati raccolti i dati di 665 donne vaccinate con Flucelvac Tetra durante 3 stagioni influenzali nell'emisfero settentrionale (dal 2017-18 al 2019-20), il 28% delle quali esposto durante il primo trimestre. Sulla base degli esiti delle gravidanze e degli esiti definitivi di sicurezza neonatale, in nessuna fase della gravidanza sono stati evidenziati esiti avversi fetali, neonatali o per la gravidanza, attribuibili al vaccino. Con Flucelvac Tetra non sono stati effettuati studi di tossicità riproduttiva e dello sviluppo. Sulla base dei dati di tossicità riproduttiva e dello sviluppo relativi al vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero (TIVc), non si prevede un aumento del rischio di anomalie dello sviluppo. **Allattamento.** Non è noto se Flucelvac Tetra sia escreto nel latte materno. Non si prevedono effetti su neonati/lattanti. Flucelvac Tetra può essere somministrato durante l'allattamento. **Fertilità.** Non sono disponibili dati sulla fertilità umana. I dati sugli animali relativi al vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero (TIVc) non hanno mostrato effetti sulla fertilità femminile. Gli effetti sulla fertilità maschile negli animali non sono stati valutati. **4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.** Flucelvac Tetra non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

**4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza.** La sicurezza di Flucelvac Tetra negli adulti di età pari o superiore a 18 anni è stata valutata in uno studio randomizzato e controllato (V130\_01), nel quale 1334 soggetti hanno ricevuto Flucelvac Tetra. In questo studio clinico, nei soggetti che hanno ricevuto Flucelvac Tetra e in quelli che hanno ricevuto il comparatore, un vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero, sono state segnalate percentuali simili di reazioni avverse sollecitate locali e sistemiche. Le reazioni segnalate più comunemente ( $\geq 10\%$ ) nei soggetti che hanno ricevuto Flucelvac Tetra sono state dolore nella sede d'iniezione (34%), cefalea (14%), affaticamento (14%), mialgia (14%), eritema (13%) e indurimento (10%). L'incidenza di alcune reazioni avverse è stata considerevolmente più bassa nei soggetti di età  $\geq 65$  anni rispetto ai soggetti di età compresa tra 18 e <65 anni (vedere tabella in basso). **Elenco delle reazioni avverse in forma tabellare.** Le reazioni avverse segnalate sono elencate in base alle seguenti categorie di frequenza: molto comune ( $\geq 1/10$ ); comune ( $\geq 1/100$ , <1/10); non comune ( $\geq 1/1000$ , <1/100), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

**Tabella 1: Reazioni avverse segnalate dopo la vaccinazione in adulti di età pari o superiore a 18 anni negli studi clinici e nella sorveglianza post-marketing**

Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA	Molto comune ( $\geq 1/10$ )	Comune ( $\geq 1/100$ , <1/10)	Non comune ( $\geq 1/1000$ , <1/100)	Non nota <sup>3</sup>
Disturbi del sistema immunitario				Reazioni allergiche o da ipersensibilità immediata, incluso lo shock anafilattico
Disturbi del metabolismo e della nutrizione		Perdita dell'appetito		
Patologie del sistema nervoso	Cefalea <sup>1</sup>			Parestesia, sindrome di Guillain-Barré
Patologie gastrointestinali		Nausea, diarrea, vomito <sup>2</sup>		
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo				Reazioni cutanee generalizzate incluse prurito, orticaria o eruzione cutanea non specifica
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Mialgia <sup>1</sup>	Artralgia		
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione	Dolore in sede di iniezione, stanchezza <sup>1</sup> , eritema, indurimento <sup>1</sup>	Ecchimosi, brividi	Febbre ( $\geq 38$ °C)	Gonfiore esteso dell'arto sede di iniezione

<sup>1</sup> Segnalato con frequenza comune nella popolazione anziana di età pari o superiore a 65 anni.

<sup>2</sup> Segnalato con frequenza non comune nella popolazione anziana di età pari o superiore a 65 anni.

<sup>3</sup> Reazioni avverse segnalate durante la sorveglianza post-marketing.

**Popolazione pediatrica (età compresa tra 2 e meno di 18 anni).** La sicurezza di Flucelvacx Tetra nei bambini di età compresa tra 2 e meno di 18 anni è stata valutata in due studi clinici, V130\_03 e V130\_12. Nello studio randomizzato e controllato V130\_03, 1159 soggetti pediatrici hanno ricevuto Flucelvacx Tetra (584 soggetti di età compresa tra 9 e <18 anni; 575 soggetti di età compresa tra 4 e <9 anni). I bambini di età compresa tra 9 e meno di 18 anni hanno ricevuto una dose singola di Flucelvacx Tetra. I bambini di età compresa tra 4 e meno di 9 anni hanno ricevuto una o due dosi (a distanza di 4 settimane) di Flucelvacx Tetra in base all'anamnesi relativa alle precedenti vaccinazioni antinfluenzali del soggetto. In questo gruppo d'età, 235 soggetti pediatrici hanno ricevuto una dose e 340 soggetti hanno ricevuto due dosi. In questo studio clinico, nei soggetti che hanno ricevuto Flucelvacx Tetra e in quelli che hanno ricevuto il comparatore, il vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero, sono state segnalate percentuali simili di reazioni avverse sollecitate locali e sistemiche. Nello studio multinazionale, randomizzato, con osservatore cieco V130\_12, la popolazione valutabile ai fini della sicurezza includeva un totale di 2255 bambini di età compresa tra 2 e meno di 18 anni che hanno ricevuto Flucelvacx Tetra (580 soggetti di età compresa tra 2 e <6 anni; 564 soggetti di età compresa tra 6 e <9 anni; 1111 soggetti di età compresa tra 9 e <18 anni). I bambini di età compresa tra 9 e meno di 18 anni hanno ricevuto una dose singola di Flucelvacx Tetra. I bambini di età compresa tra 2 e meno di 9 anni hanno ricevuto una o due dosi (a distanza di 28 giorni) di Flucelvacx Tetra in base all'anamnesi relativa alle precedenti vaccinazioni

antinfluenzali del soggetto. Le reazioni avverse locali e sistemiche più comuni segnalate in entrambi gli studi sono descritte in basso per ogni sottogruppo pediatrico. Le reazioni avverse più comuni ( $\geq 10\%$ ) segnalate nei soggetti pediatrici di età compresa tra 9 e <18 anni sono state dolore nella sede d'iniezione (58%), cefalea (22%), eritema (19%), affaticamento (18%), mialgia (16%) e indurimento (15%). Le reazioni avverse locali e sistemiche più comuni ( $\geq 10\%$ ) dopo qualsiasi vaccinazione nei bambini di età compresa tra 6 e meno di 9 anni sono state dolore nella sede d'iniezione (61%), eritema nella sede d'iniezione (25%), indurimento nella sede d'iniezione (19%), affaticamento (16%), cefalea (16%) ed ecchimosi nella sede d'iniezione (11%). Le reazioni avverse locali e sistemiche più comuni ( $\geq 10\%$ ) dopo qualsiasi vaccinazione nei bambini di età compresa tra 2 e meno di 6 anni sono state sensibilità eccessiva nella sede d'iniezione (54%), eritema nella sede d'iniezione (23%) sonnolenza (21%), irritabilità (19%), indurimento nella sede d'iniezione (15%), cambiamenti delle abitudini alimentari (14%) ed ecchimosi nella sede d'iniezione (11%). In confronto agli adulti di età pari o superiore a 18 anni, nei soggetti pediatrici sono state in genere segnalate percentuali più elevate di reazioni avverse locali e sistemiche. Nei bambini che hanno ricevuto una seconda dose di Flucelvacx Tetra, l'incidenza delle reazioni avverse dopo la seconda dose di vaccino è stata simile o leggermente inferiore a quella osservata dopo la prima dose. La frequenza delle reazioni avverse nei bambini di età compresa tra 2 e meno di 18 anni in questi studi clinici è descritta nella tabella 2 in basso.

**Tabella 2: Reazioni avverse registrate negli studi clinici, nei bambini di età compresa tra 2 e <18 anni**

Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA	Reazioni avverse	Frequenza		
		Da 2 a <9 anni		Da 9 a <18 anni
		Da 2 a <6 <sup>1</sup>	Da 6 a <9	
Disturbi del metabolismo e della nutrizione	Perdita dell'appetito	N/A	Molto comune	Comune
Patologie del sistema nervoso	Cefalea	N/A	Molto comune	Molto comune
Patologie gastrointestinali	Diarrea	Comune	Comune	Comune
	Nausea	N/A	Comune	Comune
	Vomito	Comune	Comune	Comune
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Mialgia <sup>2</sup>	N/A	Molto comune	Molto comune
	Artralgia	N/A	Comune	Comune
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione	Dolorabilità in sede di iniezione	Molto comune	N/A	N/A
	Dolore in sede di iniezione	N/A	Molto comune	Molto comune
	Eritema in sede di iniezione	Molto comune	Molto comune	Molto comune
	Indurimento in sede di iniezione	Molto comune	Molto comune	Molto comune
	Ecchimosi in sede di iniezione	Molto comune	Molto comune	Comune
	Sonnolenza	Molto comune	N/A	N/A
	Irritabilità	Molto comune	N/A	N/A
	Stanchezza	N/A	Molto comune	Molto comune
	Cambiamento delle abitudini alimentari	Molto comune	N/A	N/A
	Brividi	Comune	Comune	Comune
Febbre ( $\geq 38$ °C)	Comune	Comune	Comune	

<sup>1</sup> La fascia d'età più bassa nello studio V130\_03 era quella compresa tra 4 e <6 anni.

<sup>2</sup> Mialgia segnalata con frequenza comune (3% e 6%) nei bambini di età compresa tra 6 e <9 e tra 9 e <18 anni, rispettivamente, nello studio V130\_12.

**Segnalazione delle reazioni avverse sospette.** La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. **4.9. Sovradosaggio.** Non sono disponibili dati sul sovradosaggio di Flucelvacx Tetra. In caso di sovradosaggio, sono raccomandati il monitoraggio delle funzioni vitali e un possibile trattamento sintomatico. **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE. 5.1. Proprietà farmacodinamiche.** Categoria farmacoterapeutica: vaccini, vaccino antinfluenzale. Codice ATC: J07BB02. **Meccanismo d'azione.** Flucelvacx Tetra conferisce un'immunizzazione attiva nei confronti dei quattro ceppi di virus influenzali (due di sottotipo A e due di tipo B) contenuti nel vaccino. Flucelvacx Tetra induce anticorpi umorali diretti contro le emoagglutinine. Questi anticorpi neutralizzano i virus influenzali. Flucelvacx Tetra è prodotto in cellule Madin Darby Canine Kidney (MDCK). Non vi sono livelli specifici dei titoli degli anticorpi responsabili dell'inibizione dell'emoagglutinazione (HI), dopo vaccinazione con un vaccino antinfluenzale inattivato, che siano associati a protezione nei confronti del virus influenzale. In alcuni studi nell'uomo, titoli anticorpali di 1:40 o superiori sono stati associati a una protezione nei confronti dell'influenza in un massimo del 50% dei soggetti. Gli anticorpi diretti contro un tipo o sottotipo di virus influenzale conferiscono una protezione limitata o nessuna protezione nei confronti di un altro. Inoltre, è possibile che gli anticorpi diretti contro una variante antigenica di virus influenzale non proteggano da una nuova variante antigenica dello stesso tipo o sottotipo. Si raccomanda la rivaccinazione annuale con i vaccini antinfluenzali attuali, poiché l'immunità diminuisce nel corso dell'anno dopo la vaccinazione e i ceppi circolanti dei virus influenzali cambiano di anno in anno. **Effetti farmacodinamici. Immunogenicità di**

*Flucelvacx Tetra negli adulti di età pari o superiore a 18 anni.* L'immunogenicità di Flucelvacx Tetra è stata valutata in adulti di età pari o superiore a 18 anni in uno studio randomizzato, controllato, in doppio cieco (V130\_01). In questo studio, i soggetti hanno ricevuto Flucelvacx Tetra (N=1334) o una delle due formulazioni del comparatore, un vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero (TIVc) [TIV1c (N=677) o TIV2c (N=669)]. La risposta immunitaria a ciascuno degli antigeni del vaccino è stata determinata 21 giorni dopo la vaccinazione. Gli endpoint di immunogenicità sono stati la media geometrica dei titoli anticorpali (GMT) per la risposta di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) e le percentuali di soggetti che hanno presentato sierconversione, definita come la presenza di un titolo HI pre-vaccinazione <1:10 e di un titolo post-vaccinazione  $\geq 1:40$ , oppure di un titolo HI pre-vaccinazione  $\geq 1:10$  con un aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale HI nel siero. Flucelvacx Tetra è risultato non inferiore a TIVc. La non inferiorità è stata stabilita per tutti e 4 i ceppi influenzali inclusi in Flucelvacx Tetra, come dimostrato dai rapporti delle GMT e dalle differenze nella percentuale di soggetti che hanno presentato sierconversione 3 settimane dopo la vaccinazione. La risposta anticorpale ai ceppi dell'influenza B contenuti in Flucelvacx Tetra è stata superiore alla risposta anticorpale ottenuta dopo vaccinazione con TIVc, contenente un ceppo dell'influenza B della linea alternativa. Non è stata osservata alcuna evidenza di interferenza immunologica nei confronti di altri ceppi inclusi nel vaccino a seguito dell'aggiunta del secondo ceppo di influenza B. Le analisi per sottogruppi di età nei soggetti di età compresa tra 18 e meno di 65 anni e nei soggetti di età pari o superiore a 65 anni hanno confermato che le risposte anticorpali HI (GMT e differenze nelle percentuali di sierconversione nel gruppo del vaccino) soddisfacevano i criteri di non inferiorità immunologica 3 settimane dopo la vaccinazione per tutti e 4 i ceppi influenzali in entrambi i gruppi d'età. I dati di non inferiorità sono riassunti nella tabella 3.

**Tabella 3: Non inferiorità di Flucelvacx Tetra in confronto a TIVc negli adulti di età pari o superiore a 18 anni – set di analisi per protocollo (V130\_01)**

		Flucelvacx Tetra N=1250	TIV1c/TIV2c <sup>a</sup> N=635/N=639	Rapporto gruppo vaccino (IC 95%)	Differenza gruppo vaccino (IC 95%)
A/H1N1	GMT (IC 95%)	302,8 (281,8-325,5)	298,9 (270,3-330,5)	1,0 (0,9-1,1)	-
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup> (IC 95%)	49,2% (46,4-52,0)	48,7% (44,7-52,6)	-	-0,5% (-5,3-4,2)
A/H3N2	GMT (IC 95%)	372,3 (349,2-396,9)	378,4 (345,1-414,8)	1,0 (0,9-1,1)	-
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup> (IC 95%)	38,3% (35,6-41,1)	35,6% (31,9-39,5)	-	-2,7% (-7,2-1,9)
B1	GMT (IC 95%)	133,2 (125,3-141,7)	115,6 (106,4-125,6)	0,9 (0,8-1,0)	-
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup> (IC 95%)	36,6% (33,9-39,3)	34,8% (31,1-38,7)	-	-1,8% (-6,2-2,8)
B2	GMT (IC 95%)	177,2 (167,6-187,5)	164,0 (151,4-177,7)	0,9 (0,9-1,0)	-
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup> (IC 95%)	39,8% (37,0-42,5)	35,4% (31,7-39,2)	-	-4,4% (-8,9-0,2)

Abbreviazioni: GMT=media geometrica dei titoli (*geometric mean titer*); IC=intervallo di confidenza.

<sup>a</sup> Il vaccino comparatore per i confronti di non inferiorità per A/H1N1, A/H3N2 e B1 è TIV1c, per B2 è TIV2c.

<sup>b</sup> Percentuale di sieroconversione=percentuale di soggetti con titolo HI prevaccinazione <1:10 e titolo HI post-vaccinazione ≥1:40, oppure con titolo HI prevaccinazione ≥1:10 e aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale HI post-vaccinazione.

**Grassetto**=criterio di non inferiorità soddisfatto.

*Efficacia clinica del vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero (TIVc) nei confronti dell'influenza confermata tramite coltura negli adulti.* L'esperienza relativa all'efficacia di TIVc è di rilievo per Flucelvacx Tetra, dal momento che entrambi i vaccini sono prodotti con la stessa tecnica e hanno composizioni sovrapponibili. È stato condotto uno studio multinazionale, randomizzato, con osservatore cieco, controllato verso placebo (V58P13), per valutare l'efficacia e la sicurezza di TIVc durante la stagione influenzale 2007-2008 in adulti di età compresa tra 18 e meno di 50 anni. È stato arruolato un totale di 11.404 soggetti a ricevere TIVc (N=3828), Agripal, vaccino antinfluenzale trivalente prodotto su uova (TIVeA) (N=3676) o placebo (N=3900) in rapporto 1:1:1. L'efficacia di TIVc è stata definita come la

prevenzione dell'influenza sintomatica confermata tramite coltura e dovuta a virus antigenicamente corrispondenti a quelli presenti nel vaccino in confronto al placebo. I casi di influenza sono stati individuati tramite sorveglianza attiva e passiva della malattia di tipo influenzale (*influenza-like illness*, ILI). La ILI è stata definita in base alla definizione dei Centri per il controllo e la prevenzione della malattia (*Centers for Disease Control and Prevention*, CDC), vale a dire febbre (temperatura orale ≥100,0 °F / 38 °C) e tosse o mal di gola. Dopo un episodio di ILI sono stati raccolti tamponi faringei e nasali per l'analisi. È stata calcolata l'efficacia del vaccino nei confronti di ceppi influenzali corrispondenti a quelli del vaccino, nei confronti di tutti i ceppi di virus influenzali e nei confronti di singoli sottotipi di virus influenzali (tabella 4).

**Tabella 4: Efficacia comparativa del vaccino TIVc vs. placebo nei confronti dell'influenza confermata tramite coltura per sottotipo di virus influenzale (V58P13)**

	TIVc (N=3776)		Placebo (N=3843)		Efficacia del vaccino*	
	Tasso di attacco (%)	Numero di soggetti con influenza	Tasso di attacco (%)	Numero di soggetti con influenza	%	Limite inferiore dell'IC 97,5% unilaterale
<b>Ceppi antigenicamente corrispondenti</b>						
Completivamente	0,19	7	1,14	44	83,8	61,0
Singoli ceppi	A/H3N2**	0,05	2	0	-	-
	A/H1N1	0,13	5	1,12	43	67,4
	B**	0	0	0,03	1	-
<b>Tutti i casi di influenza confermata tramite coltura</b>						
Completivamente	1,11	42	3,64	140	69,5	55,0
Singoli ceppi	A/H3N2	0,16	6	0,65	25	35,1
	A/H1N1	0,16	6	1,48	57	73,0
	B	0,79	30	1,59	61	49,9

\* Intervalli di confidenza unilaterali simultanei al 97,5% per l'efficacia di ciascun vaccino antinfluenzale in confronto al placebo in base agli intervalli di confidenza corretti secondo Sidak per i due rischi relativi. Efficacia del vaccino=(1-rischio relativo)x100%.

\*\* Il numero di casi di influenza dovuta ai ceppi influenzali A/H3N2 o B corrispondenti al vaccino era troppo basso per una valutazione corretta dell'efficacia del vaccino stesso.

**Popolazione pediatrica. Immunogenicità di Flucelvacx Tetra nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 4 e meno di 18 anni.** L'immunogenicità di Flucelvacx Tetra nei bambini di età compresa tra 4 e meno di 18 anni è stata valutata nell'ambito di uno studio randomizzato, controllato, in doppio cieco (V130\_03). In questo studio, i soggetti hanno ricevuto Flucelvacx Tetra (N=1159) o una delle due formulazioni del comparatore, un vaccino antinfluenzale trivalente prodotto in cellule di mammifero (TIVc) [TIV1c (N=593) o TIV2c (N=580)]. La risposta immunitaria a ciascuno degli antigeni del vaccino è stata determinata 21 giorni dopo la vaccinazione. Gli endpoint di immunogenicità sono stati la GMT della risposta HI e le percentuali di soggetti che hanno presentato sieroconversione (percentuale di sieroconversione), definita come la presenza di un titolo HI pre-vaccinazione <1:10 e di un titolo post-vaccinazione ≥1:40, oppure di un titolo HI pre-vaccinazione ≥1:10 con un aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale HI nel siero. Flucelvacx Tetra è risultato non inferiore a TIVc nei bambini di età compresa tra 4 e meno di 18 anni. La non inferiorità è stata stabilita per tutti e 4 i ceppi influenzali inclusi in Flucelvacx Tetra, come dimostrato dai rapporti delle GMT e dalle differenze nella percentuale di soggetti che hanno presentato sieroconversione 3 settimane dopo la vaccinazione. La risposta anticorpale ai ceppi dell'influenza B contenuti in Flucelvacx Tetra è stata superiore alla risposta anticorpale ottenuta dopo vaccinazione con TIVc contenente un ceppo dell'influenza B della linea alternativa. Non è stata osservata alcuna evidenza di interferenza immunologica nei confronti di altri ceppi inclusi nel vaccino a seguito dell'aggiunta del secondo ceppo di influenza B. I dati di immunogenicità nei soggetti di età compresa tra 4 e meno di 18 anni sono riassunti nella tabella 5.

**Tabella 5: GMT e percentuali di sieroconversione (con IC 95%) in soggetti di età compresa tra 4 e <18 anni, 3 settimane dopo la vaccinazione con Flucelvacx Tetra o TIV1c/TIV2c – Set per protocollo (V130\_03)**

		Flucelvacx Tetra N=1014	TIV1c/TIV2c <sup>a</sup> N=510
A/H1N1	GMT (IC 95%)	1090 (1027-1157)	1125 (1034-1224)
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup>	72% (69-75)	75% (70-78)
A/H3N2	GMT (IC 95%)	738 (703-774)	776 (725-831)
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup>	47% (44-50)	51% (46-55)
B1	GMT (IC 95%)	155 (146-165)	154 (141-168)
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup>	66% (63-69)	66% (62-70)
B2	GMT (IC 95%)	185 (171-200)	185 (166-207)
	Percentuale di sieroconversione <sup>b</sup>	73% (70-76)	71% (67-75)

<sup>a</sup> Per i ceppi influenzali H1N1, H3N2 e B1 sono riportati i dati di TIV1c, mentre per il ceppo influenzale B2 sono riportati i dati di TIV2c.  
<sup>b</sup> Percentuale di sieroconversione=percentuale di soggetti con titolo HI prevaccinazione <1:10 e titolo HI post-vaccinazione ≥1:40, oppure con titolo HI prevaccinazione ≥1:10 e aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale HI post-vaccinazione.  
**Grassetto**=criteri di immunogenicità CHMP soddisfatti. La percentuale di soggetti con sieroconversione o aumento significativo del titolo anticorpale HI è >40%, la percentuale di soggetti che hanno raggiunto un titolo HI ≥1:40 è >70%.

*Efficacia clinica di Flucelvax Tetra nella popolazione pediatrica di età compresa tra 2 e meno di 18 anni.* L'efficacia assoluta di Flucelvax Tetra è stata valutata in bambini di età compresa tra 2 e meno di 18 anni nello studio V130\_12. Si trattava di uno studio di efficacia multinazionale, randomizzato, controllato con

un vaccino comparatore non antinfluenzale, condotto in 8 Paesi per 3 stagioni influenzali, nel quale sono stati arruolati 4514 soggetti per ricevere 0,5 mL di Flucelvax Tetra o un comparatore non antinfluenzale in rapporto 1:1. In base all'anamnesi relativa alle precedenti vaccinazioni antinfluenzali, i partecipanti hanno ricevuto una o due dosi (a distanza di 28 giorni) del vaccino in studio. L'efficacia di Flucelvax Tetra è stata determinata sulla base della prevenzione della malattia influenzale confermata causata da qualsiasi ceppo influenzale di tipo A o B. I casi di influenza sono stati individuati mediante sorveglianza attiva della malattia di tipo influenzale (*influenza-like illness*, ILI) e confermati tramite coltura virale e/o reazione a catena della polimerasi in tempo reale (*real-time polymerase chain reaction*, RT-PCR). Un episodio di ILI è stato definito come la presenza di temperatura corporea febbrile ≥37,8 °C associata ad almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, mal di gola, congestione nasale o rinorrea. È stata calcolata l'efficacia del vaccino nei confronti dell'influenza confermata in laboratorio (tabella 6).

**Tabella 6: Numero di soggetti con influenza di prima comparsa confermata tramite RT-PCR o coltura ed efficacia assoluta del vaccino (IC 95%) in soggetti di età compresa tra 2 e meno di 18 anni- FAS efficacia1 (studio V130\_12)**

	Numero di soggetti per protocollo <sup>1</sup>	Numero di casi di influenza	Tasso di attacco (%)	Efficacia del vaccino (EV)	
				%	IC 95% della EV
<b>Influenza confermata tramite RT-PCR o coltura</b>					
Flucelvax Tetra	2257	175	7,8	54,63	45,67; 62,12
Comparatore non antinfluenzale	2252	364	16,2	-	-
<b>Influenza confermata tramite coltura</b>					
Flucelvax Tetra	2257	115	5,1	60,81	51,30; 68,46
Comparatore non antinfluenzale	2252	279	12,4	-	-
<b>Influenza confermata tramite coltura dovuta a virus antigenicamente corrispondenti</b>					
Flucelvax Tetra	2257	90	4,0	63,64	53,64; 71,48
Comparatore non antinfluenzale	2252	236	10,5	-	-

<sup>1</sup> Numero di soggetti nel *full-analysis set* (FAS) - efficacia, che ha incluso tutti i soggetti randomizzati, che hanno ricevuto una vaccinazione in studio e dai quali sono stati ottenuti dati di efficacia.

**5.2. Proprietà farmacocinetiche.** Non pertinente. **5.3. Dati preclinici di sicurezza.** I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute e tossicità della riproduzione e dello sviluppo. **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1. Elenco degli eccipienti.** Sodio cloruro, Potassio cloruro, Magnesio cloruro esaidrato, Sodio fosfato dibasico diidrato, Potassio fosfato monobasico, Acqua per preparazioni iniettabili. **6.2. Incompatibilità.** In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali. **6.3. Periodo di validità.** 1 anno. **6.4. Precauzioni particolari per la conservazione.** Conservare in frigorifero (2 °C-8 °C). Non congelare. Tenere la siringa preriempita nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. **6.5. Natura e contenuto del contenitore.** 0,5 mL di sospensione in siringa preriempita (vetro di tipo I), con stantuffo (gomma bromobutilica), con o senza ago. Confezione da 1 siringa preriempita, con o senza ago. Confezione da 10 siringhe preriempite, con o senza aghi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. **6.6. Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione.** Il vaccino è pronto per l'uso. Agitare prima dell'uso. Dopo che è stato agitato, il vaccino si presenta normalmente come sospensione da limpida a leggermente opalescente. Ispezionare visivamente il vaccino per la eventuale presenza di particolato e cambiamento di colore prima della somministrazione. In presenza di particolato estraneo e/o cambiamento dell'aspetto fisico, non somministrare il vaccino. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** Seqirus Netherlands B.V. Paasheuvelweg 28, 1105BJ Amsterdam, Paesi Bassi. **8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.** AIC: 047475 025; AIC: 047475 013; AIC: 047475 037. **9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.** Data della prima autorizzazione: 12 dicembre 2018. **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO.** 07/2024. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali, <http://www.ema.europa.eu>.

**PREZZO AL PUBBLICO**

AIC: 047475 025 € 21,03  
AIC: 047475 013-037 € 210,30

**CLASSE DI RIMBORSABILITÀ**

C

**REGIME DI FORNITURA**

RR

**Seqirus Srl**

Via del Pozzo 3/A, San Martino, 53035 Monteriggioni (SI), Italia  
Tel. 0577 096400 - Fax 0577 1722007 - [info.italy@seqirus.com](mailto:info.italy@seqirus.com)  
[www.csiseqirus.it](http://www.csiseqirus.it)

CSL Seqirus 2024

Codice Deposito Aziendale ITA-QIVc-24-0004

**CSL Seqirus**